

GGG COPD Gespreksformulier



Naam, adres en contactgegevens

Patiënt 	Contactpersoon 	Apotheker 
 Datum 1^{ste} gesprek:	 Datum 2^{de} gesprek:	Arts 
De patiënt heeft toestemming gegeven om de bevindingen van het GGG gesprek met de behandelende arts te delen. ☐ Ja - ☐ Nee		


Vragen van de patiënt over COPD of zijn behandeling?

Nota's (Ernst van COPD? Exacerbaties ? Hospitalisaties gelinkt aan COPD? Comorbiditeiten? ...)

Voorgestelde oplossingen:

- ☐ Extra informatie of raadgeving
- ☐ Inhalatie-instructies (folder of video)
- ☐ Folder COPD / rookstop
- ☐ Geheugensteun, reminder
- ☐ Medicatieschema
- ☐ Medicatienazicht
- ☐ Nicotinesubstitutie

☐	
☐	



Bezorgdheden/Ervaringen van de patiënt ☐ Bezorgdheden/twijfels: ☐ Onvoldoende of niet behandelde klachten: ☐ Teveel geneesmiddelen ☐ Kost van de behandeling ☐ Andere:	Ervaren symptomen (CAT-test) ☐ Hoest ☐ Fluimen ☐ Beklemmend gevoel thv borst ☐ Kortademigheid bij inspanningen (helling, trap, ...) ☐ Kortademigheid bij dagelijkse activiteiten ☐ Angst ☐ Slaapstoornissen ☐ Vermoeidheid ☐ Andere:
Onvoldoende kennis/onbegrip ☐ COPD ☐ Aanpak exacerbaties ☐ Herkennen van symptomen ☐ Behandeling ☐ Alarmsymptomen ☐ Preventie ☐ Roken ☐ Fysieke activiteit ☐ Evenwichtige voeding ☐ Andere:	Levensstijl ☐ Roker (Fagerströmtest) ☐ Lichte afhankelijkheid > 60 min na het ontwaken en/of < 10 sig/dag ☐ Matige afhankelijkheid 30-60 min na het ontwaken en/of 10-15 sig/dag ☐ Ernstige afhankelijkheid < 30 min na het ontwaken en/of > 15 sig/dag ☐ Motivatie rookstop: ☐ Onvoldoende lichaamsbeweging ☐ (Risico op) overgewicht ☐ (Risico op) ondervoeding ☐ Andere:
Comedicatie ☐ Theofylline ☐ Oraal corticosteroïd ☐ Azithromycine ☐ Antitussiva ☐ Zuurstof ☐ Mucolytica ☐ Antibiotica ☐ Rookstopmiddelen Nota's (Kenni's? Gebruik? Ongewenste effecten?)	Afgeleverde of toegediende vaccins ☐ Griep Datum: ☐ Pneumokokken Datum: ☐ Covid-19 Datum: ☐ RSV Datum: ☐ Andere:



Patiënt

GGG COPD
Gespreksformulier

	Kennis	Gebruik	Ongewenste effecten	Therapietrouw
Inhalator 1: Gebruikelijke posologie: Evaluatie therapietrouw: ☐ Goed tot zeer goed (>80%) ☐ Onvoldoende (<80%) ☐ Overgebruik (>120%)	☐ Indicatie niet gekend (onderhoudsbehandeling > < noodbehandeling) ☐ Foutieve posologie ☐ Andere: 	☐ Foutieve inhalatietechniek: ☐ Problemen met hand/mond-coördinatie ☐ Onvoldoende inhalatiekracht ☐ Moeilijkheden met de handvaardigheid: ☐ Andere: 	☐ Droge mond ☐ Trillen van de handen, hoofdpijn, hartkloppingen ☐ Heesheid, keelpijn, schimmelinfectie van de mond ☐ Andere: 	☐ Gebrek aan kennis / twijfels over de behandeling ☐ Angst voor ongewenste effecten of afhankelijkheid ☐ Vergeetachtigheid ☐ Complexiteit van de behandeling, polymedicatie ☐ Ongewenste effecten ☐ Moeilijkheden voor hernieuwing voorschrift/beheer ☐ Kost van de behandeling ☐ Andere:
Inhalator 2: Gebruikelijke posologie: Evaluatie therapietrouw: ☐ Goed tot zeer goed (>80%) ☐ Onvoldoende (<80%) ☐ Overgebruik (>120%)	☐ Indicatie niet gekend (onderhoudsbehandeling > < noodbehandeling) ☐ Foutieve posologie ☐ Andere: 	☐ Foutieve inhalatietechniek: ☐ Problemen met hand/mond-coördinatie ☐ Onvoldoende inhalatiekracht ☐ Moeilijkheden met de handvaardigheid: ☐ Andere: 	☐ Droge mond ☐ Trillen van de handen, hoofdpijn, hartkloppingen ☐ Heesheid, keelpijn, schimmelinfectie van de mond ☐ Andere: 	☐ Gebrek aan kennis / twijfels over de behandeling ☐ Angst voor ongewenste effecten of afhankelijkheid ☐ Vergeetachtigheid ☐ Complexiteit van de behandeling, polymedicatie ☐ Ongewenste effecten ☐ Moeilijkheden voor hernieuwing voorschrift/beheer ☐ Kost van de behandeling ☐ Andere: